

Procedure per il contenimento degli animali

Ovini

I diversi nuclei di pecore sono separati in box distinti in base ai gruppi di monta, alle prove sperimentali in itinere, alla razza, etc, etc.

Gli animali si fanno avvicinare alla mangiatoia mediante l'offerta di concentrato o fieno. In questo modo gli animali si dispongono negli spazi della rastrelliera e si auto catturano.

Ove necessario si pratica un contenimento individuale in diverse posture, in piedi, in piedi con legatura leggera del collo, in decubito laterale senza legature, in decubito laterale mediante pastoie.

Nel caso in cui non si disponga di autocattura, gli animali vengono radunati e afferrati per un arto posteriore. Successivamente, gli animali vengono bloccati per la testa appoggiandola al bacino.

Bovini

Gli animali si fanno avvicinare alla mangiatoia mediante l'offerta di concentrato o fieno.

I bovini che si dispongono negli spazi della rastrelliera si autocatturano.

Si appronta un capezzone (se il necessario si devia lateralmente la testa e si lega alla rastrelliera). Successivamente si applica la nasiera per la conduzione all'esterno del paddock.

Per manovre complesse (mascalcia) l'animale viene inserito nel travaglio.

Legature contenitive:

Queste si rendono necessarie nei casi in cui occorre immobilizzare l'animale per impedire che possa danneggiare se stesso o l'operatore quando occorre svolgere delle manualità come il prelievo di latte, l'esplorazione rettale in un animale irrequieto, un monitoraggio ecografico, l'esplorazione vaginale, tosatura, decornazione, piccoli interventi chirurgici, incisione di ascessi, piccole suture, medicazioni.

Con animali poco collaborativi si può vincolare un arto, oltre che la testa, oppure con una corda molto lunga che gira intorno all'animale si contengono i garretti in modo da delimitare lo spazio di movimento posteriore.

Applicazione delle balze.



Cavalli

Gli animali si fanno avvicinare tramite foraggio/concentrato. Successivamente si applica la capezza e si procede a conduzione con lunghina. La legatura eseguita è quella ai 2 venti.

La contenzione viene eseguita in travaglio o con torcinaso.

Il torcinaso viene impiegato quando il cavallo rifiuta il piede, quando non rimane fermo e non consente di esplorare il retto, quando è irrequieto nel caso di un prelievo venoso o per l'inserimento di un ago cannula.

Per manovre che si preannunciano più lunghe è preferibile inserire l'animale nel travaglio (monitoraggio di un calore o di una gravidanza, o tecniche di fecondazione artificiale).



Suini

La cattura e il contenimento dei suinetti vengono eseguiti mediante trazione/sollevamento degli arti posteriori

Anche la cattura e il contenimento dei magroncelli viene eseguito mediante trazione/sollevamento degli arti posteriori

La cattura degli animali adulti viene eseguita mediante avvicinamento al travaglio previo digiuno e successiva offerta di cibo. Successivamente si procede all'applicazione del morso massellare vincolato al travaglio per praticare iniezioni, prelievi, inseminazioni, raschiati cutanei, ecografie.

